

คำแนะนำเพิ่มเติม



- 1) ควรแปะยาบริเวณผิวหนังที่ไม่มีอาการระคายเคืองและถูกฉายรังสี บริเวณที่เหมาะสมที่สุดคือบริเวณทรวงอกลำตัว หรือต้นแขนด้านบน
- 2) ควรเลือกแปะบริเวณที่ไม่มีขน หรือถ้าจำเป็นต้องแปะให้ใช้กรรไกรเล็มขนออก ไม่ควรใช้มีดโกน
- 3) ควรทำความสะอาดบริเวณที่จะแปะยาก่อนด้วยน้ำสะอาดเท่านั้น ไม่ควรใช้สบู่ และรอให้บริเวณแห้งสนิทจึงแปะแผ่นยา
- 4) ควรตรวจสอบแผ่นยาก่อนใช้ว่ามีการถูกตัดแบ่ง หรือมีการชำรุดฉีกขาดก่อนใช้ทุกครั้ง
- 5) แผ่นยาที่ใช้เสร็จให้ลอกออก แล้วเอาด้านที่เป็นกาวประกบเข้าหากัน และนำไปทิ้งให้เหมาะสม แล้วล้างมือด้วยน้ำสะอาด
- 6) หากแผ่นยาหลุดออกมาก่อนเวลาเปลี่ยนแผ่น ให้ทิ้งแผ่นยานั้นไป และนำแผ่นยาแผ่นใหม่มาแปะที่ผิวหนังบริเวณอื่น
- 7) เก็บในซองยาเดิมที่ยังไม่ได้เปิดใช้และเก็บให้พ้นมือเด็ก



คำเตือน & ข้อห้ามใช้

- 1) ไม่ควรวางกระเปาะน้ำร้อน ขวดน้ำร้อน บริเวณที่แปะแผ่นยา และไม่ควรรอบไอน้ำหรือแช่อ่างน้ำอุ่น เพราะจะทำให้การปลดปล่อยตัวยาเร็วขึ้น ซึ่งอาจทำให้ได้รับยาในขนาดสูงเกิน
- 2) ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เพราะจะทำให้กดระบบประสาท และกดการหายใจได้
- 3) ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
- 4) ผู้ที่ใช้ยานี้ติดต่อกันมาเป็นเวลานานไม่ควรหยุดยาเองโดยทันที หากต้องการหยุดใช้ให้ปรึกษาแพทย์
- 5) ยาอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน มึนงง เบื่ออาหาร ในช่วงแรก และอาจทำให้เกิดอาการท้องผูก ความดันต่ำ หัวใจเต้นช้าลง

หากมีอาการง่วงซึมมาก การรับรู้ผิดปกติ

หัวใจเต้นช้าหายใจลำบาก

คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง

ควรรีบกลับมาปรึกษาแพทย์



Fentanyl

Transdermal

Fentanyl Transdermal



ยาเฟ็นทานิล
ชนิดแผ่นแปะ

เป็นยาที่ใช้บรรเทาอาการปวดระดับปานกลางถึง

ปวดรุนแรงในผู้ป่วยที่ต้องการรักษา

อาการปวดอย่างต่อเนื่อง ไม่แนะนำ

ให้ใช้รักษาอาการปวดเฉียบพลัน

และอาการปวดแบบเป็นๆหายๆ

รูปแบบผลิตภัณฑ์

เป็นรูปแบบยาแผ่นแปะผิวหนัง


ที่จะปลดปล่อยยาระงับ

อาการปวด อย่างต่อเนื่อง

นาน 72 ชั่วโมง (3 วัน)




วิธีการแปะแผ่นยา




1.

แกะแผ่นยาออก
จากซอง โดยให้แกะตาม
รอยปรุ(ตามลูกศรชี้)




2.

แผ่นยาเฟ็นทานิล



3.

บนแผ่นจะมีรอยแยกอยู่
ให้ลอก แผ่นที่ปิดอยู่ออก
โดย
ห้ามสัมผัสกับผิว



4.

แปะแผ่นยาบริเวณ
ทรวงอก ลำตัวหรือ
แขนด้านบน
แล้วใช้มือกดเบาๆไว้
30 วินาที
เพื่อให้แผ่นยาติดแน่น



5.

เมื่อแปะเสร็จแล้ว
ให้ล้างมือด้วย
น้ำสะอาด

เมื่อลอกแผ่นแปะเฟ็นทานิลออก ระดับ
ยาในเลือดจะเหลือครึ่งหนึ่งโดยใช้เวลา
ประมาณ 17 ชั่วโมง